

# 令和8年産 水稲栽培ごよみ

## 夢つくし 元気つくし ヒノヒカリ 実りつくし

### 望まれる「福岡の米」づくりの推進

- ①種子更新率100%
- ②食味向上(タンパク質含量6.8%以下)
- ③気象変動に左右されない栽培技術の実践
- ④農業安全使用の徹底
- ⑤生産履歴の全生産者記帳の実践と情報提供

農業の使用に当たっては、以下のことに気を付けてください。

- ①農業の使用基準を守ってください。
- ②防除日誌を記帳して防除記録を残してください。
- ③農業を散布するときは、風の有無を確認し、散布機圧力を調整するなど周辺の作物に農業が飛散しないよう十分注意してください。

| 区分<br>月・旬 | 主 作 業                             | 主 作 業                             |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5 中       | 生育                                | 生育                                |
| 5 月       | 夢つくし                              | 元気つくし、ヒノヒカリ、実りつくし                 |
| 5 月 下     | ・播種(催芽粉150g/箱)                    | ・播種(催芽粉150g/箱)                    |
| 6 上       | 育苗期                               | 育苗期                               |
| 6 中       | ・土づくり、まわらのすき込み                    | ・土づくり、まわらのすき込み                    |
| 6 月 下     | ・耕起、代かき<br>・雑草薬剤、移植               | ・耕起、代かき<br>・雑草薬剤、移植               |
| 7 上       | ・浅水管理<br>・除草剤散布                   | ・浅水管理<br>・除草剤散布                   |
| 7 中       | ・浅水管理                             | ・浅水管理                             |
| 7 月 下     | ・間断かん水                            | ・間断かん水                            |
| 8 上       | ・中干し開始(葉数18本/株より)<br>・黒乾で小ひびが入る程度 | ・中干し開始(葉数18本/株より)<br>・黒乾で小ひびが入る程度 |
| 8 中       | ・間断かん水                            | ・間断かん水                            |
| 8 月 下     | ・穂肥                               | ・穂肥                               |
| 9 上       | ・湛水管理                             | ・湛水管理                             |
| 9 中       | ・病害虫防除                            | ・病害虫防除                            |
| 9 月 下     | ・間断かん水                            | ・間断かん水                            |
| 10 上      | ・落水(収穫7日前)                        | ・落水(収穫7日前)                        |
| 10 中      | ・収穫                               | ・収穫                               |
| 10 月 下    | ・収穫                               | ・収穫                               |
| 年内        | ・耕起、稲わらすき込み                       | ・耕起、稲わらすき込み                       |

### 収穫・乾燥上の注意

- ・適期収穫：籾水分 夢つくし 24~28%  
元気つくし、ヒノヒカリ、実りつくし 22~28%
- ・早期落水は絶対にしない
- ・乾燥玄米は水分14~15%

記帳農業は、令和8年2月の登録内容に基づき記載しています。農業の登録は、随時変更されていますので、農業を使用する際には、再度、包装容器・袋に記載されている有効期限および登録内容を確認して下さい。

### 品種特性表

※出穂期・成熟期は6月20日移植のデータ。その他は、品種特性表に基づく。

| 熟 期 | 品 種 名     | 出穂期<br>月・日 | 成熟期<br>月・日 | 株 長<br>cm | 穂 長<br>cm | 穂 数<br>本/m <sup>2</sup> | 耐 倒<br>伏 性 | 耐 寒<br>性 | 外 観<br>品質 | 食 味 | 10a当り<br>玄米量<br>kg/10a | 耐 病 性   |
|-----|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------|------------|----------|-----------|-----|------------------------|---------|
| 極早生 | 夢つくし      | 8-8        | 9-12       | 76        | 17.3      | 372                     | 中          | 難        | 上の上       | 上の上 | 520                    | 弱 やや弱   |
| 早 生 | 元 気 つ く し | 8-19       | 9-26       | 84        | 20.1      | 377                     | やや弱        | 難        | 上の上       | 上の上 | 568                    | 弱 中     |
| 中 生 | ヒ ノ ヒ カ リ | 8-26       | 10-6       | 84        | 19.0      | 379                     | やや弱        | 難        | 上の上       | 上の中 | 554                    | やや弱 やや弱 |
| 中 生 | 実 り つ く し | 8-31       | 10-15      | 81        | 20.6      | 348                     | やや弱        | 中        | 上の上       | 上の上 | 598                    | やや弱 中   |

### 育苗のポイント

- ①10a当り種子量 3.0kg 20~23箱
- ②育苗日数 20~25日
- ③播種量 1箱当り催芽粉で150g(乾燥粉120g)
- ④目標とする苗の姿 苗齢 2.8~3.3葉、苗長11~14cm
- ⑤浸種・催芽 種子消毒済み種子のため、最初の24時間は水を替えない。催芽は鳩胸程度とする。  
播種前日に種子を水から上げ、陰干しを行う。
- ⑥床土：培土 1箱当り2kg 覆土：培土 1箱当り1kg
- ⑦播種時にタチガレエースM液剤1000倍液を1箱当り500ml灌注する。
- ⑧被覆資材は苗長が4cmになったら取り除く。
- ⑨葉色が淡い場合は、育苗肥料(4-3-6)を1箱当り10g(1袋で100箱分)

### 施肥基準

※肥肥の2回目目は1回目の7日後。

| 品種名       | 施肥項目 | 堆きゅう肥       | 土壌改良資材                                            | 基 肥                   | 施用量  | 種 肥               | 施用量       |
|-----------|------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------------|-----------|
| 夢つくし      |      |             | ミネラルG 200kg<br>又は<br>珪鉄 200kg<br>又は<br>けい酸加里 40kg | ちくごのめぐみ<br>(14-14-14) | 30kg | NK2号<br>(16-0-16) | 15kg 10kg |
| 元 気 つ く し |      | 土力目標<br>1トン |                                                   |                       | 30kg |                   | 10kg 10kg |
| ヒ ノ ヒ カ リ |      |             |                                                   |                       | 35kg |                   | 10kg 10kg |
| 実 り つ く し |      |             |                                                   |                       | 35kg |                   | 15kg 10kg |

緩効性肥料による1回全量施肥の場合 (10a当り施用量)

| 品種名       | 施肥項目 | 堆きゅう肥       | 土壌改良資材                                            | 基 肥                      | 施用量  |
|-----------|------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 夢つくし      |      |             | ミネラルG 200kg<br>又は<br>珪鉄 200kg<br>又は<br>けい酸加里 40kg | Jコート2000<br>(20-10-10)   | 35kg |
| 元 気 つ く し |      | 土力目標<br>1トン |                                                   |                          |      |
| ヒ ノ ヒ カ リ |      |             |                                                   | Jコート2000緩効<br>(20-10-10) | 40kg |
| 実 り つ く し |      |             |                                                   |                          |      |

### 雑草防除基準

※野鳥等、周辺作物に飛散すると被害を生じるほか、農薬により出向できなくなるため、十分注意して防除を行う。

| 施 期  | 農 薬 名         | 10a当り<br>使用量         | 使用時期<br>(移植後日数)  | ノビエ     |
|------|---------------|----------------------|------------------|---------|
| 初・中期 | ラオウ           | 1キロ粒剤 1kg            | 移植時~10           | 2.5葉期まで |
|      | ジャンボ          | 250g                 | 移植直後~10          | 2.5葉期まで |
|      | サラブレッドKAI     | 1キロ粒剤 1kg            | 移植時~10           | 2.5葉期まで |
|      | ジャンボ          | 400g                 | 移植直後~10          | 2.5葉期まで |
| 中・後期 | ジェイソウル        | 1キロ粒剤 1kg            | 移植時~10           | 2.5葉期まで |
|      | ジャンボ          | 450g                 | 1~10             | 2.5葉期まで |
| 中・後期 | クリンチャーバースME液剤 | 1000ml<br>(水70~100ℓ) | 15~40<br>収穫5日前まで | 5.0葉期まで |
|      | ロイヤント乳剤※      | 200ml<br>(水25~100ℓ)  | 20~収穫45日前まで      | 5.0葉期まで |

1. 除草剤使用後は最低4日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しをしない。
2. 水もちの悪い水田、軟弱苗では葉害が出やすいので注意する。

※落水状態で散布した際は3日以内に入水する。

### 病害虫防除基準

※農業によるミツバチへの危害防止のため稲の花蜜に農業の使用は避ける。

| 品種名                         |                              | 夢つくし      |     | 元気つくし、ヒノヒカリ、実りつくし      |                       |                              |           |     |                        |
|-----------------------------|------------------------------|-----------|-----|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|-----|------------------------|
| 使用時期                        | 対象病害虫名                       | 農薬名       | 国産性 | 10a当り使用量               | 使用時期                  | 対象病害虫名                       | 農薬名       | 国産性 | 10a当り使用量               |
| 6月<br>は種時<br>(農土前)<br>～移植当日 | いもち病<br>白葉枯病・ウンカ類<br>コブノメイガ他 | ブーンセクテラ粒剤 | 国産  | 1kg/10a<br>(50～100g/箱) | は種時<br>(農土前)<br>～移植当日 | いもち病<br>白葉枯病・ウンカ類<br>コブノメイガ他 | ブーンセクテラ粒剤 | 国産  | 1kg/10a<br>(50～100g/箱) |

| 夢つくし               |                       |                                                  | 元 気 つ く し、ヒノヒカリ、実りつくし |                    |                                                  |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 使用時期               | 対象病害虫名                | 農 薬 名 (国産) 10a当り使用量                              | 使用時期                  | 対象病害虫名             | 農 薬 名 (国産) 10a当り使用量                              |
| 8月<br>上~中旬<br>出穂直前 | いもち病<br>ウンカ類<br>カメムシ類 | ブレードスタークルDL(国)<br>4kg                            | 8月中旬<br>出穂直前          | ウンカ類幼虫<br>紋枯病      | オオタカシロゲンカ(国)<br>(収穫14日前まで)<br>4kg                |
| 9月<br>補正防除         | ウンカ・カメムシ類<br>紋枯病      | スタークル粉剤DL(国)<br>(収穫7日前まで)<br>3kg                 | 8月中旬~下旬<br>出穂直前       | いもち病・ウンカ類<br>カメムシ類 | ブレードスタークルDL(国)<br>(収穫7日前まで)<br>4kg               |
| 8月上~中旬<br>出穂直前     | ウンカ類幼虫<br>紋枯病         | オオタカシロゲンカ(国)<br>(収穫21日前まで)                       | 8月中旬~下旬<br>出穂直前       | ウンカ類幼虫<br>紋枯病      | オオタカシロゲンカ(国)<br>(収穫21日前まで)                       |
| 8月上~中旬<br>出穂直前     | いもち病<br>もみ枯病・紋枯病      | ノンプラスフロアブル(国)<br>(収穫7日前まで)<br>1000倍液を<br>60~150ℓ | 8月中旬~下旬<br>出穂直前       | いもち病<br>もみ枯病・紋枯病   | ノンプラスフロアブル(国)<br>(収穫7日前まで)<br>1000倍液を<br>60~150ℓ |
| 補正防除               | ウンカ・カメムシ類             | スタークル液剤10(国)<br>(収穫7日前まで)<br>1000倍液を<br>60~150ℓ  | 補正防除                  | ウンカ・カメムシ類          | スタークル液剤10(国)<br>(収穫7日前まで)<br>1000倍液を<br>60~150ℓ  |

※ジャンボタニシ対策はスクミノンが使用できます。

●この栽培暦は、JAの生産基準を兼ねています ●栽培履歴にもれなく記入して、収穫前に提出して下さい ●JA米とそれ以外を区分してJAに出荷しましょう

久留米市農業振興協議会

JAくるめ本店営業事業部 33-3671

東部営業センター 45-0345

西部営業センター 26-4111

久留米普及指導センター 47-5101

久留米市生産流通課 30-9164

JAくるめ ホームページ <http://www.ja-kurume.or.jp>

R.8.2作成