

飼料用米「夢一献」栽培暦

J Aにじ
久留米普及指導センター
(令和8年1月作成)

月旬	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月																															
	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中																															
生育と主な作業		○種子消毒	○播種		○耕起（麦ワラ鋤込み）	○基肥	○代かき	○田植		○追肥1回目	○追肥2回目	■出穂				■成熟	○収穫																																	
水管理						浅水	間断かん水	中干し		浅水			間断かん水			満水→自然落水																																		
農薬	○基本防除 【種子消毒時】 <table><tr><td>混用</td><td>テクリードCフロアブル</td><td>200倍</td><td>24時間浸漬</td></tr><tr><td></td><td>スミチオン乳剤</td><td>1000倍</td><td></td></tr></table> 【播種時】 <table><tr><td>タチガレン液剤</td><td>500倍</td><td>500ml/箱</td></tr></table> ○基本防除（箱施薬） 【田植3日前～前日】 <table><tr><td>ブーンクロノス箱粒剤</td><td>50g/箱</td></tr><tr><td>または、ブイゲットフェルテラゼクサロンL粒剤</td><td></td></tr><tr><td>または、フルスロツトル箱粒剤</td><td></td></tr></table> 効果を安定させるため、できるだけ前日までに散布する。 なお、散布後は葉茎に付着した薬剤を、覆土に落とした後に水をかける。 △補正防除（適宜）いもち病 ○本田基本防除（8月中旬） 【8月中旬】（ウンカ類、紋枯病、カメムシ類） <table><tr><td>オーケストラロムダンモンカット粉剤DL</td><td>3～4kg/10a</td></tr><tr><td>または、</td><td>1000倍</td></tr><tr><td>オーケストラロムダンモンカットエア</td><td>2000倍</td></tr><tr><td>+ スタークル顆粒水溶剤</td><td>(100ℓ/10a)</td></tr></table> △補正防除（適宜）ウンカ類 △補正防除 <table><tr><th>防除適期</th><th>薬剤名、使用量、注意点</th></tr><tr><td>ウンカ類適宜</td><td>スタークル粉剤DL 3kg/10a（※収穫7日前までしか使用できません。） 又は、スタークル顆粒水溶剤 2000倍 100ℓ/10a（※収穫7日前までしか使用できません。）</td></tr><tr><td>いもち病</td><td>ダブルカット粉剤3DL 3～4kg/10a（※穂揃期までしか使用できません。） 又は、ダブルカットフロアブル 1000倍 100ℓ/10a（※穂揃期までしか使用できません。）</td></tr></table> ※ミツバチへの影響を考慮し、ネオニコチノイド系農薬（スタークル粉剤DLなど）は、稲の出穂、開花期の使用は避け、穂揃い期の7日～10日後に実施する。																			混用	テクリードCフロアブル	200倍	24時間浸漬		スミチオン乳剤	1000倍		タチガレン液剤	500倍	500ml/箱	ブーンクロノス箱粒剤	50g/箱	または、ブイゲットフェルテラゼクサロンL粒剤		または、フルスロツトル箱粒剤		オーケストラロムダンモンカット粉剤DL	3～4kg/10a	または、	1000倍	オーケストラロムダンモンカットエア	2000倍	+ スタークル顆粒水溶剤	(100ℓ/10a)	防除適期	薬剤名、使用量、注意点	ウンカ類適宜	スタークル粉剤DL 3kg/10a（※収穫7日前までしか使用できません。） 又は、スタークル顆粒水溶剤 2000倍 100ℓ/10a（※収穫7日前までしか使用できません。）	いもち病	ダブルカット粉剤3DL 3～4kg/10a（※穂揃期までしか使用できません。） 又は、ダブルカットフロアブル 1000倍 100ℓ/10a（※穂揃期までしか使用できません。）
混用	テクリードCフロアブル	200倍	24時間浸漬																																															
	スミチオン乳剤	1000倍																																																
タチガレン液剤	500倍	500ml/箱																																																
ブーンクロノス箱粒剤	50g/箱																																																	
または、ブイゲットフェルテラゼクサロンL粒剤																																																		
または、フルスロツトル箱粒剤																																																		
オーケストラロムダンモンカット粉剤DL	3～4kg/10a																																																	
または、	1000倍																																																	
オーケストラロムダンモンカットエア	2000倍																																																	
+ スタークル顆粒水溶剤	(100ℓ/10a)																																																	
防除適期	薬剤名、使用量、注意点																																																	
ウンカ類適宜	スタークル粉剤DL 3kg/10a（※収穫7日前までしか使用できません。） 又は、スタークル顆粒水溶剤 2000倍 100ℓ/10a（※収穫7日前までしか使用できません。）																																																	
いもち病	ダブルカット粉剤3DL 3～4kg/10a（※穂揃期までしか使用できません。） 又は、ダブルカットフロアブル 1000倍 100ℓ/10a（※穂揃期までしか使用できません。）																																																	

品種特性									
<品種特性表のデータ>									
名称	出穂期 (月/日)	成熟期 (月/日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/㎡)	千粒重 (g)	粗玄米収量 (kg/10a)	耐倒伏性	白葉枯病 抵抗性
夢一献	8月25日	10月8日	75	19.0	391	25.5	566	強	やや弱
・ いもち病耐性は中である。									

施肥基準						
品種名	施肥項目	基 肥	穂 肥		成分量 (kg/10a)	
			第1回 8月1日頃	第2回 8月10日頃	N	P
					K	
夢一献		ちくごのめぐみ444 (14-14-14) 50kg (N:7.0kg)	硫安 15kg (N:3.2kg)	硫安 10kg (N:2.1kg)	12.3	7.0
		ペレット鶏糞 150kg + 硫安 20kg (N:3.6kg) (N:4.2kg)			13.1	3.9
		ハイエムコート30 (30-5-5) 45kg (N:12.0kg)	—	—	13.5	2.3

※ ペレット鶏糞は、窒素成分4.0%、化学肥料に対する肥効率60%として計算

除草剤使用基準													
時期	剤形	除草剤名	10aあたり 使用量	使用時期 (田植後日数)	ノビエ (効果のある葉齢)	一年生 広葉	マツ バイ	ホタル イ	ウリカ ワ	ミズガ ヤツリ	ヒルム シロ	セリ	クログ ワイ
初期・中期	粒剤	サラブレッドKAI1キロ粒剤	1kg	0～10日	～2.5葉	○	○	○	○	○	○	○	○
		ラオウ1キロ粒剤	1kg	0～12日	～2.5葉	○	○	○	○	○	○	○	○
		ジェイソウル1キロ粒剤	1kg	0～10日	～2.5葉	○	○	○	○	○	○	○	—
	ジャンボ剤	サラブレッドKAIジャンボ	10パック	0～10日	～2.5葉	○	○	○	○	○	○	○	○
		ラオウジャンボ	10パック	0～10日	～2.5葉	○	○	○	○	○	○	○	○
		ジェイソウルジャンボ	10パック	1～10日	～2.5葉	○	○	○	○	○	○	○	—
	液剤	サラブレッドKAIフロアブル	500ml	0～10日	～2.5葉	○	○	○	○	○	○	○	○
		ラオウフロアブル	500ml	0～10日	～2.5葉	○	○	○	○	○	○	○	○
		ジェイソウルフロアブル	500ml	0～10日	～2.5葉	○	○	○	○	○	○	○	—
後期	液剤	クリンチャーバスME液剤	1000ml/水100ℓ	15日～収穫50日前まで	～5.0葉	○	○	○	○	○	—	○	○
		ロイアント乳剤	200ml/水100ℓ	20日～収穫45日前まで	～5.0葉	○	○	—	○	○	—	○	—
		クリンチャーEW	100ml/水100ℓ	20日～収穫30日前まで	～6.0葉	—	—	—	—	—	—	—	—